

## Exemple de formulaire d'évaluation clinique<sup>1</sup>

### Renseignements du client

Nom :	Prénom(s) :
Date de naissance :	Numéro d'assurance-maladie :

### Antécédents médicaux (y compris la santé mentale et la consommation de substance)

---

---

---

#### Consommation de substance

Type :	Quantité :	Fréquence :
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Remarque : La consommation concomitante d'alcool et d'autres déprimeurs du SNC (p. ex., benzodiazépines, opioïdes) est associée à une augmentation significative du risque de surdose. Si possible, les clients doivent subir une évaluation complète de la consommation de substance. Pour les individus présentant une consommation de substance ou des troubles de l'usage de substance parallèles, fiez-vous à votre jugement clinique, en donnant la priorité aux substances associées à un risque de symptômes graves de sevrage, et les clients doivent être informés des risques d'une consommation concomitante.

### Consommation d'alcool habituelle

Nombre de jours de consommation d'alcool durant les 7 derniers jours :

Lors d'une journée habituelle :

Quel type d'alcool buvez-vous? (Entourez les réponses qui s'appliquent)

Bière    Vin    Xérès    Spiritueux    Alcool non destiné à la consommation

En quelle quantité (pour chaque type)? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Consommation journalière totale<sup>2</sup> :

1 Adapté avec gratitude à partir d'un document fourni par PHS Community Services Society  
2 Utilisez le calculateur de verres standard : <http://aodtool.cfar.uvic.ca/index-stddt.html>

## Méfais liés à l'alcool

Durant les 3 derniers mois, le client a connu :

- Symptômes de sevrage de l'alcool, y compris des crises liées à l'alcool
- Consommation d'alcool non destiné à la consommation
- Chutes ou blessures liées à l'alcool
- Visites aux urgences liées à l'alcool
- Évanouissement/perte de connaissance à cause de l'alcool
- Stratégies de consommation de survie (p. ex., mendicité, recyclage, partage avec des amis)

## Évaluation du risque de sevrage, du TUA et de la gravité du TUA

Score [PAWSS](#) :

En option :

Diagnostic et gravité du TUA :

Nombre de symptômes DSM-5-TR :

Consommation dangereuse ou nocive (score [AUDIT](#)):

Gravité du TUA (score [SADQ](#)):

Admissible à la gestion de l'alcool :    Oui            Non

Comportement de référence du client (à utiliser pour évaluer l'ivresse excessive au moment de la distribution) :

Commentaires :

Rempli par : \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_