

Exemple de formulaires d'évaluation de l'ivresse avant les doses

Cette annexe présente deux outils d'évaluation de l'ivresse ainsi que des considérations concernant le choix de l'approche d'évaluation avant les doses et de distribution des doses appropriée. Les exemples d'outil d'évaluation présentés ci-dessous permettent deux approches différentes de distribution d'alcool contrôlé.

- [Outil d'évaluation 1](#) permet une approche binaire dans laquelle un client qui montre un des symptômes d'ivresse listés ne reçoit pas sa dose d'alcool prévue jusqu'à une nouvelle évaluation l'heure suivante
- [Outil d'évaluation 2](#) présente une progression dans l'évaluation de l'ivresse, dans laquelle les clients modérément ivres se voient proposer une dose réduite tandis que des signes d'ivresse importante induisent une retenue de la dose jusqu'à l'évaluation suivante

Considérations concernant la sélection de l'approche d'évaluation avant les doses et de distribution de l'alcool

La sélection de l'approche d'évaluation de l'ivresse avant les doses et de distribution de l'alcool appropriée dépend d'un éventail de facteurs, dont :

- Les circonstances et besoins médicaux du client
- Les objectifs et préférences déclarés du client (consignés lors de l'admission ou lors des réunions de suivi, lorsque la réponse du client n'est pas influencée par l'ivresse actuelle ou des symptômes de sevrage)
- La structure et l'emplacement du PGA; la possibilité d'avoir accès à de l'alcool à l'extérieur si la dose est refusée
- La capacité du PGA à surveiller le bien-être des clients entre les doses

Par exemple, un outil d'évaluation de l'ivresse binaire peut être plus approprié dans une structure médicale (p. ex., hôpital ou soins de longue durée) lorsque les besoins médicaux complexes du patient nécessitent une gestion de l'alcool plus stricte. D'un

autre côté, les programmes de jour ou les environnements basés sur le logement moins rigoureux (p. ex., refuges, logements avec services de soutien) peuvent permettre la fourniture de doses réduites aux clients qui montrent des signes d'ivresse légers à modérés; ce processus peut réduire le risque de consommation à l'extérieur et améliorer le maintien dans le programme en prenant en compte les préférences des clients.

Il est recommandé de discuter de l'approche d'évaluation de l'ivresse et de distribution des doses avec le client pendant la planification de la gestion de l'alcool; les clients doivent recevoir l'assurance que la non-distribution d'une dose prévue n'est pas une action punitive, mais uniquement un moyen de garantir leur sécurité. L'approche convenue doit être consignée dans l'accord passé avec le client afin qu'elle puisse être revue lors des réunions de suivi.

Les fournisseurs d'alcool contrôlé peuvent envisager de proposer une solution de rechange non alcoolisée (p. ex., bière sans alcool ou jus de raisin) aux clients dont la dose n'est pas distribuée; cela peut contribuer à éviter que le client se sente exclu et lui permettre de participer à l'aspect social de la consommation de boisson dans le cadre de sa routine.

Outil d'évaluation 1 (évaluation binaire)

(Adapté avec gratitude à partir d'un document fourni par Alberta Health Services)

Évaluez et consignez avant de donner l'alcool prescrit.

Date (aaaa-mm-jj)						
Heure (hh:mm)						
Parole 0 : Discute normalement (Identique au comportement de référence) 1 : Parole ralentie, troubles de l'élocution, marmonnements, parole décousue et/ou inintelligible						
Coordination 0 : Marche et mouvements identiques au comportement de référence 1 : Titube, chancelant, chute; difficulté à se mettre ou à rester dans une position debout						
Jugement et humeur 0 : Orienté et concentré; comportement, jugement et émotion appropriés 1 : Désorienté, confus, distrait; comportements extrêmes (p. ex., trop amical, rit fort, colérique, agressif)						
Niveau de conscience : 0: Alerte et attentif 1 : S'endort, perd le fil de ses pensées, difficulté à s'éveiller						
Total des points						
Dose d'alcool donnée						
Signature du fournisseur						

Consignes : Si la valeur est égale à 0, fournissez la dose.

Si la valeur est supérieure à 0, envisagez de conserver la dose et évaluez à nouveau le client dans une heure.

Outil d'évaluation 2 (évaluation progressive permettant des demi-doses)

(Adapté avec gratitude à partir d'un outil du PGA de Sudbury)

	COLONNES A et B		COLONNE C	COLONNE D	
	COLONNE A	COLONNE B			
	La dose peut être distribuée comme prévu		Si le client présente deux des signes d'ivresse suivants, seule une moitié de la dose peut être distribuée (si le client sort de son schéma de comportement normal)	La dose ne doit pas être distribuée si l'individu présente l'un des signes/symptômes listés dans cette colonne (si le client sort de son schéma de comportement normal)	
		Envisagez une surveillance accrue pour les clients qui montrent ce qui suit			
CRITÈRES	Parole	Normale	Troubles de l'élocution et/ou parole ralentie	<ul style="list-style-type: none"> • Marmonnements • Déclarations répétitives 	<ul style="list-style-type: none"> • Parole décousue • Incompréhensible • Parole forte, bruyante • Commentaires ou gestes grossiers/inappropriés
	Coordination	Marche et mouvements normaux	<ul style="list-style-type: none"> • Trébuchements • Mouvements lents 	<ul style="list-style-type: none"> • Chancelant • Titube 	<ul style="list-style-type: none"> • Difficulté à s'asseoir droit • Tombe de la chaise • Difficulté à se mettre dans/ou à conserver une position debout • Tombe
	Signes Mentaux	Concentré Comportement, émotions et jugements attendus, en se basant sur notre connaissance du client		Perd le fil de ses pensées	<ul style="list-style-type: none"> • Confus • Agité • Agressif ou querelleur • Désorienté • Boit en essayant d'être meilleur que les autres • Trop amical • Rit fort • Présente des sautes d'humeur • Inhibitions diminuées
	Niveau De Conscience	Alerte et attentif	Somnolent, mais se réveille facilement	S'endort	<ul style="list-style-type: none"> • Incapable de suivre/participer à la conversation • Incapable d'accomplir une tâche